

SUR LA RÉPARTITION DU *COELACHYRUM OLIGOBRACHIATUM* A. CAMUS

PAR Aimée CAMUS

Le *Cœlachyrum oligobrachiatum* A. Camus avait été décrit in *Bull. Mus. Paris*, 2^e série, III, n^o 6, p. 546 (1931), d'après une plante découverte par M. Th. MONOD, à Izelilène, sur la lisière de l'Adrar des Iforas (n^o 373), au Sud du Sahara.

M. Marc MURAT, attaché à la Mission d'études de la Biologie des Acridiens (Insectarium du Jardin d'Essai d'Alger), en explorant les régions situées beaucoup plus à l'ouest, principalement la Mauritanie, a constaté que l'aire de cette curieuse Graminée s'étendait jusqu'à l'Océan Atlantique.

M. Marc MURAT, qui a fait de très intéressantes observations sur les Graminées de ces régions, a trouvé que le *Cœlachyrum oligobrachiatum* existait, assez fréquent et disséminé, dans le Tasiast, vers Louten et Tamarat, dans le Tijirit, vers Nich et Mréder, à environ 15° W., et enfin parfois, en assez grande abondance, sur le littoral, surtout un peu au sud du cap El Fieh, vers le 20° N. Il est plus rare vers le cap Timiris.

Au bord de l'Océan Atlantique, cette Graminée croît en assez grande abondance sur les collines littorales à coquillages ; plus à l'intérieur, elle semble localisée dans les bas fonds argileux (Tasiast) ou sur les petits massifs schisteux (Tijirit).

M. Marc MURAT a donc constaté l'existence du *Cœlachyrum oligobrachiatum* en des points assez éloignés de l'Adrar des Iforas où il avait été primitivement recueilli, mais situés vers la même latitude entre 20 et 21°. Peut-être existe-t-il des localités intermédiaires entre l'Adrar des Iforas et le Tijirit, à moins que cette espèce n'occupe plus actuellement qu'une aire disjointe et ne se rencontre guère qu'à l'état sporadique.